
Third Lecture
Genetics

By : Al Nurd Amal Shawqi



« From Gene to protein »

- **Gene** : is a segment of DNA that codes for a specific protein or determines a specific trait.

هو قطعة من الـ DNA يحمل المعلومات عشان تصنع بروتين معين لصفة معينة.

- **proteins** : are large biomolecules composed of one or more polypeptide chains

هو جزيئات حيوية ضخمة تتكون من سلسلة أو أكثر من عديد الببتيد

- **polypeptide** : is a long chain of amino acids linked together by peptide bonds

هو سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية مرتبطة مع بعض برابط ببتيدي.



مقطع من هادا الـ DNA يسمى « جين »

★ « الوحدة البنائية للبروتين هي : حموض أمينية »

★ عدد أنواع الأحماض الأمينية : 20 حمض نووي.

((هذا بشكل عام، هلأ بتفصله))

* Inside every cell in our body there is a nucleus and cytoplasm
* The nucleus contains the genetic material DNA, and DNA is coiled in the form of chromosomes
* protein synthesis takes place in the cytoplasm, specifically on the ribosomes which are the factory
* The cell is surrounded by a plasma membrane. Composed of two layers of phospholipids.
* The function of the plasma membrane: is to protect the internal components of the cell, and it is selectively permeable.

1. Nucleus: has a darkly staining area, the nucleolus.
   1.A. Nucleolus: A darkly staining area inside the nucleus
   ↳ produces ribosomes

   2.A. Nuclear envelope: A double membrane surrounding the nucleus
   3.A. Nuclear pores: Allow communication between the nucleus and the cytoplasm.

   Function: Contains the genetic material DNA.

2 **Cytoplasm**:

1.B. Cytosol : A semifluid substance containing soluble elements and cytoskeletal structures.

2.B. Endoplasmic reticulum ER : A complex network of fine convoluted interconnecting channels

3.B. Ribosomes : in association with the ER, they are involved in the biosynthesis of proteins and lipids.

Other Organelles :-

- **Golgi apparatus** : Responsible for secretion and packaging of cellular products. انزاز تغليف منتجات الخلية

- **Mitochondria** : Involved in energy production ATP through oxidative phosphorylation
لـ الفسفرة التأكسدية

- **Lysosomes** : Involved in the degradation of cellular waste material
تحلل نفايات الخلية

- **Peroxisomes** : Involved in the disposal of toxic molecules.
تتخلص من الجزيئات السامة

DNA : The hereditary Material

Composition :

* DNA is a nucleic acid
* ↳ made of Long polymer of nucleotides.


* Each nucleotide = 3 parts
  - Nitrogenous base
  - Sugar molecule
  - phosphate molecule

[↳ = 2 types

1. • purines : Adenine A + Guanine G
2. [↳ pyrimidines : cytosine C + Thymine T + Uracil U → في الـ RNA


A ↔ T
C ↔ G

Location : DNA is found mainly in the chromosomes.



Structure: تركيب الـ DNA

* الرسمة بين مرتبة والكلام عن ملحقة.




* DNA is a double Helix made of 2 chains of nucleotids twisted around each other.

* Sugar + phosphate (Backbone)
  - They connect with phosphodiester bonds between Carbon 3 and 5.

Nitrogenous Bases: A, T, C, G
- They point toward the center of the helix.
- The nitrogenous bases are connected by hydrogen bonds.
  - مرتبطة زي ما بدون
  - A = T رابطتين
  - C ≡ G 3 روابط. (يرجع للشكل اللي فاتت)

- يصنفوا مرتين: البيورين purine حلقة بنزين مع pyrimidine البيريميدين.



رابطة ببتيدية من خلالها تربط الحموض الأمينية

١٠ الـ DNA: عبارة عن لولب مزدوج من سلسلتين
- يكون من قواعد نيتروجينية مرتبطة مع بعض بروابط هيدروجينية.
- مرتبطة السلاسل بتكون متعاكسة ٥′ → ٣′ و ٣′ → ٥′

* Why does DNA need this structure ?!

Because the DNA must be :

↳ versatile / Flexible → to code for the huge variety of different genes.

↳ Accurate → to make an identical copy of itself during every cell division.

• عملية بناء البروتين : هي عملية تحويل تسلسل معين من النيوكليوتيدات على جزيء DNA إلى لغة يمكن قراءتها بواسطة الرايبوسوم . بذلك يتم بناء سلسلة عديد الببتيد

لا تعنينا X

Replication: تضاعف الـ DNA

• The main function of replication is to inherit traits. So that every new cell gets a copy of the DNA.

• During nuclear division the two strands of the double helix separate from each other by the action of the DNA helicase enzyme.

↳ هذا الإنزيم شغلته يفك الروابط الهيدروجينية بين القواعد النيتروجينية يفصل السترين عن بعض.

- Each old strand becomes a "Template" and we build a new strand on it.
  A pairs with T, C pairs with G
  In the end we have 2 DNA instead of 1 and both are like the original.

- In this way, when cell divide, the genetic information is preserved and transferred without any change to each daughter cell
  (أي) ← عشان كمان لما البنت بتطلع تكون زيها.

- The DNA replication process is Called [Semiconservative] because only one strand of each new DNA molecule is newly made.
  الأصل : قديم .... قديم
  بعد التضاعف : قديم .... جديد
  قديم ... جديد

- DNA polymerase : The builder that adds the new nucleotides
- Replication fork : The y shape that forms when helicase unwinds the DNA.

The law : DNA polymerase works only 5' → 3'
+ That's why there is a strand that easy to be made in one go Called [Leading Strand]
بصنع السلسلة المتكاملة المتطابقة بصير باتجاه 5' لـ 3'

- The second strand, called the ~ Lagging strand ~ is made in pieces called ~ Okazaki fragments and then they are joined together into a continuous strand by the enzyme ~ DNA Ligase ~.

لـ بما إنه الـ polymerase بتشتغل بين ٥' و ٣' ، فالشريط الثاني مقلوب لأنه متوازي بالعكس ، فبيصنع حتى حتى صيرة اسمها Okazaki fragments ، وبعدين بيجي الـ DNA Ligase (مونع) بالرقم بينهن

- DNA doesn't replicate from one spot. There are several origins of replication. Each one opens in two directions so it makes a bubble shape.

- S phase = Synthis phase. Not all of the DNA replicates at the same time.

- In the end the bubbles join together = we get 2 Complete DNA molecules.

★ Chromosome Structure ★

تركيب الكروموسوم

- The idea that each chromosome is composed of a single double helix is an oversimplification.

★ الـ DNA ملفوف ومضغوط بطريقة معقدة جداً.

- A chromosome is very much wider than the diameter of a DNA double helix. → ★ تخيل خيط رفيع جداً انلف وانضغط صار سميك

- In addition, the amount of DNA in nucleus of each cell in humans means that the total length of DNA contained in the chromosomes. if fully extended, would be several meters long!

★ في الخلية الواحدة متلك ~ 2 متر DNA

- In fact, the total length of the human chromosome complements is less than half a millimeter. لو الطول الكلي لمجموعة الكروموسومات البشرية أقل من نصف ملي متر

The packaging of DNA

تغليف ال DNA

* ليه بيفضل تغليف ال DNA ؟! عشان يصير كروموسوم ويتم ذلك على « عدة مراحل لف وطي »

- The packaging of DNA into chromosomes involves several orders of DNA coiling and folding. . معناها لفة وحدة وخلص . لا بتلف طبقة فوق طبقة زيد لما تلفي الخيط.
- In addition to the primary coiling of the DNA double helix there is secondary coiling around spherical histone ~ beads ~ forming what are called nucleosomes. . غير اللفة الأولى للحلزون المزدوج . في لفة ثانية حوالين خرزات (histones) بتكون تركيب اسمها (nucleosomes)
- There is a tertiary coiling of nucleosomes to form the chromatin fibers that form long loops on a scaffold non-histone acidic proteins, which are further wound in a tight coil to make up the chromosome as visualized under the light microscope. في لفة ثالثة لـ nucleosomes معها تشكل chromatin fibers

الأحماض الأمينية بتشكل خيوط حلزونية على شكل مجموعات من acidic proteins وأيضا histones وبعدين بتلتف لفة خفيفة زيادة عشان تشكل الكروموسوم chromosome اللي بنشوفه تحت الميكروسكوب الضوئي